

**ORDRE DES PICIFORMES**  
**Pic à dos blanc** *Dendrocopos leucotos* – A239  
*Espèce d'intérêt communautaire*

ESPECES OISEAUX  
~ Pics ~

05

**Directive Oiseaux**


Annexe I

**Autres statuts de protection**

Liste Nationale : Protégé  
Liste Rouge : Rare

Convention de Berne : Annexe 2

*Cité au bordereau du site*



© J.C. AURIA dans "Gestion forestière et diversité biologique" I.D.F.

**CARACTERISTIQUES**

- ⇒ **Descriptif** : ressemble à un Pic épeiche (plumage contrasté avec du noir, du blanc et du rouge au niveau de la tête pour le mâle) mais avec un plumage différent dans le dos (barres blanches)
- ⇒ **Particularités** : espèce très discrète, reconnaissable uniquement avec de bonnes conditions d'observation ou d'écoute.
- ⇒ **Période de sensibilité** : mars - avril (tambourinage) à juin (envol des jeunes)
- ⇒ **Effectifs** : sous-espèce pyrénéenne, uniquement présente en France dans les Pyrénées occidentales, isolée des autres populations européennes. Quelques centaines de couples estimés du pays basque jusqu'à la Haute Garonne.

Sources : "Gestion forestière et diversité biologique", éditions IDF

**HABITATS**

Animal forestier, en Hêtraie ou Hêtraies Sapinière, avec présence de bois mort et/ou dépréssant

**Sur le site :** ◆ Hêtraies  
◆ Hêtraie Sapinière

**ECOLOGIE DE L'ESPECE**

- ⇒ **Nourriture** : larves de coléoptères vivant dans le bois

**OBSERVATIONS SUR LE SITE « GRANQUET, PIBESTE, SOUM D'ECH »**

↳ Données anciennes dans le bois de Ségus (partie non aménagée).

**Deux observations récentes en forêt de Saint Pé de Bigorre.**

Date d'observation à Saint-Pé de Bigorre : **2002 et 2003**

Des prospections réalisées par l'O.N.F. au printemps 2004, avec plusieurs points d'écoute en forêt domaniale indivise de Saint-Pé de Bigorre et en forêt du Batsurguère n'ont permis aucun contact supplémentaire

Sources : O.N.F (M. DOUSSINE) et L.P.O. (D. VINCENT)

**PRATIQUES ACTUELLES DETERMINANTES**

**Effets potentiels**

- Feux accidentels
  - Gestion forestière
  - Gestion forestière
- Les feux propagés aux falaises peuvent perturber voire détruire des nidifications.
  - La faible exploitation forestière sur la plus grande partie du site permet le maintien d'un habitat favorable.
  - La plantation d'Epicéa et de Pin dans le Bois de Ségus a pu fragiliser l'habitat de l'espèce sur cette partie du massif.

**→ OBJECTIFS ET ACTIONS**

- ↳ Cf Document de référence OISEAUX