

Gazons atlantiques à Nard raide et groupements apparentés

CB : 35.1

PELOUSES ACIDIPHILES MONTAGNARDES DES PYRENEES
UE : 6230*

ANNEXE I (DIRECTIVE HABITATS)

STATUT

Habitat d'intérêt communautaire **prioritaire si riche en espèces**

LOCALISATION SUR LE SITE

Formation très largement répandue sur le site et constituant le principal type de milieu ouvert des altitudes basses et moyenne du site

SUPERFICIE ET OCCURRENCE

Surface totale : 487,23 ha (16,28 % du site)

Superficie moyenne : 4,9 ha (min 0,2 – max 52,4)

Nombre d'unité : 99 unités

Habitat unique : 45

Mosaïque : 21

Mélange : 33



Photo : LE MOAL T.

CONDITIONS STATIONNELLES

Altitude moyenne : 1 620 m (1 150 - 2 300 m)

Exposition préférentielle : indifférente

Substrat : granites et calcaires (sols acides ou décalcifiés)

Topographie : replats et bas de versants

DESCRIPTION DE L'HABITAT

Pelouses acidiphiles denses, rases, des replats et bas de versants, généralement établies sur sols profonds, acides ou décalcifiés. Elles constituent l'essentiel des pâtures à bovins de l'étage montagnard sur le site

ESPECES CARACTERISANT CET HABITAT

<i>Nardus stricta</i>	<i>Lotus corniculatus</i>
<i>Festuca rubra</i>	<i>Plantago lanceolata</i>
<i>Potentilla erecta</i>	<i>Trifolium pratense</i>
<i>Botrychium lunaria</i>	<i>Galium pumilum</i>
<i>Nigritella nigra</i>	<i>Galium verum</i>
<i>Alchemilla sp.</i>	

DECLINAISON PHYTOSOCIOLOGIQUE

Violon caninae

Nardetalia strictae

- *Nardetea strictae*

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Etat de conservation : Bon (66%)

Sens d'évolution : Stable (66%)

La nardaise constitue un milieu stable dans un contexte de pâturage adapté. Le sur-pâturage comme le sous-pâturage conduisent à la régression de bonnes espèces fourragères et à l'installation d'une pelouse ou le Nard domine. Des ligneux bas peuvent s'installer et conduire en fonction de l'exposition à des landes dominées soit par le Rhododendron en versant nord, soit par le Genévrier ou de Raisin d'ours à d'autres expositions.

VALEUR D'USAGE


Valeur pastorale : moyenne à forte, selon l'abondance en espèces fourragères graminéennes (*Agrostide vulgaire*, *Fétuque rouge*) et légumineuses (trèfles et lotiers). A l'inverse, la valeur fourragère de ces pelouses diminue à mesure que s'accroît la proportion en Nard raide

Remarque : Ces milieux constituent les pâtures les plus riches du site à l'étage montagnard, et sont majoritairement bien pâturées sur le site

ESPECES PATRIMONIALES LIEES A CET HABITAT

Richesse en insectes principalement concernant les Lépidoptères et les Orthoptères.

LOCALISATION ET ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS



Légende

— Réseau hydrographique (Hors site)

Unité d'habitat délimitée sur le terrain

— Route

▲ Pic

Etat de conservation

□ Village

■ Bon

■ Lac (Hors site)

■ Moyen

■ Mauvais

■ Limite du site

Lac de Migouélou

1 kilomètre